

9. Übungsblatt zur Vorlesung “Numerik partieller Differentialgleichungen”
(Schwache Formulierung, Lax–Milgram)

1. Aufgabe (2 Punkte (1+1))

In der Vorlesung wurde für das Randwertproblem

$$\begin{aligned} -u'' + \alpha u' + u &= f, & x \in (0, 1) \\ u'(0) &= u'(1) = 0 \end{aligned}$$

(mit $\alpha = 1$) eine schwache Formulierung mit einer nichtsymmetrischen, stetigen und koerziven Bilinearform hergeleitet.

- Sei $\alpha = 1$. Begründen Sie, warum es für $f \in L^2(0, 1)$ genau eine schwache Lösung $u \in H^1(0, 1)$ gibt.
- Zeigen Sie: Wenn $\alpha \in \mathbb{R}$ hinreichend groß ist, dann ist die zugehörige Bilinearform nicht mehr koerziv auf $H^1(0, 1)$.

2. Aufgabe (4 Punkte)

Gegeben sei die Randwertaufgabe

$$-(a(x)u')' = 0, \quad x \in (-1, 1), \quad u(-1) = 3, \quad u(1) = 0$$

mit

$$a(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x < 0, \\ 0.5, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Man gebe eine *schwache Formulierung* dieser Aufgabe und bestimme ihre Lösung.

3. Aufgabe (4 Punkte)

Sei Ω ein beschränktes Gebiet mit glattem Rand $\partial\Omega$, wobei $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. Seien c, f, g, p, q stetig. Definiere $V := \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ auf } \Gamma_1\}$.

Die Funktion $u \in H^1(\Omega)$ mit $u = g$ auf Γ_1 erfülle die *schwache Formulierung*

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v + c uv \, dx + \int_{\Gamma_2} (pu - q)v \, ds = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \text{für alle } v \in V.$$

Sei nun $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Welches klassische Problem löst u ?

Abgabe der Lösungen zu den theoretischen Aufgaben am Di, 8.01.02 **vor** der Vorlesung.

*** Wir wünschen allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest ***

*** und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2002 ! ***