Universität des Saarlandes
Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. A. Arnold / M. Ehrhardt Wintersemester 2000/2001

2. Übungsblatt zur Vorlesung "Praktische Mathematik"

(Konditionszahl, Cholesky–Verfahren)

1. Aufgabe (3 Punkte)

Das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 10^{-5} & 10^{-5} & 1 \\ 10^{-5} & -10^{-5} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 10^{-5} \\ -2 \cdot 10^{-5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

wird mit einer Arithmetik mit drei dezimalen Ziffern gelöst. Wie lautet das Resultat

a) exakt?

b) ohne Pivotsuche?

c) mit Spaltenpivotsuche?

d) mit totaler Pivotsuche?

Kommentieren Sie das Ergebnis.

2. Aufgabe (2 Punkte)

Bestimmen Sie die Konditionszahl $\kappa(A)$ der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ bezüglich der durch die Vektornormen $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ und $\|.\|_\infty$ induzierten Matrixnormen.

3. Aufgabe (2 Punkte)

Ermitteln Sie die Cholesky–Zerlegung von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 3 & 13 & 2 & 15 \\ -2 & 2 & 21 & -8 \\ 5 & 15 & -8 & 33 \end{pmatrix}.$$

4. Aufgabe (3 Punkte)

Es sei $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine symmetrische, positiv definite (m, m)–Bandmatrix, $m < n$. Zeigen Sie, daß in der Cholesky–Zerlegung $A = CC^T$ die Matrix $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine $(m, 0)$–Bandmatrix ist, d.h. $c_{ij} = 0$ für $i - j > m$ und $c_{ij} = 0$ für $j - i > 0$.

5. Aufgabe (Praktische Aufgabe) (5 Punkte)

Schreiben Sie ein Programm, welches den Gaußschen Algorithmus einmal ohne Pivot- und einmal mit Spaltenpivotsuche durchführt. Testen Sie das Programm an dem Beispiel $Ax = b = (b_i) \in \mathbb{R}^n$, wobei

$$a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i,j = 1,\dots,n,$$

$$b_i = \frac{1}{n+i-1}, \quad i = 1,\dots,n.$$

Dabei gebe man für $n = 50, 100, 200$ zu jeder Pivotstrategie $x_{10\cdot i}$, $i = 1,2,3,\dots,$ aus. Lösen Sie für $n = 10$ das lineare Gleichungssystem $Ax = b_k \in \mathbb{R}^n$ mit den rechten Seiten $b_k = e_k$, $k = 1,\dots,n$, um damit die Inverse von A zu berechnen.
Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der exakten Inversen $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit

$$b_{ij} = \frac{(-1)^{i+j}(n+i-1)!(n+j-1)!}{(i+j-1)\big[(i-1)!(j-1)!\big]^2(n-i)!(n-j)!}, \quad i,j = 1,\dots,n.$$

Bemerkung: Bei A handelt es sich um die *Hilbertmatrix*; ein berühmtes Beispiel einer schlecht konditionierten Matrix.

Hinweise:

a) Die exakte Lösung im Testbeispiel kann man erraten.

b) Die Benutzer von Scilab können ihre Resultate mit denjenigen vergleichen, die die LR–Zerlegung von Scilab (Aufruf: [L,R,P]=lu(A)) liefert und sich die Konditionszahl der Hilbertmatrix (Aufruf: cond(A)) anschauen. Außerdem können die Scilab–Funktionen für die Berechnung der Hilbertmatrix und ihrer Inversen von der PraMa–Homepage

   `http://www.num.uni-sb.DE/~ehrhardt/Ue_PraMa/`

   heruntergeladen werden.

c) Idealerweise sollte es möglich sein, das System für mehrere rechte Seiten b zu lösen, ohne die LR–Zerlegung zu wiederholen. Zur Ersparnis von Speicherplatz sollte die Matrix A dabei mit den Elementen von L und R überschrieben werden. Eventuelle Zeilenvertauschungen sollten mit einem Indexvektor realisiert werden.

Abgabe der Lösungen zu den theoretischen Aufgaben am Di, 7.11. vor der Vorlesung.
Abgabe der Lösungen zu der praktischen Aufgabe am Di, 14.11. in den Sprechstunden.